



MEDICACIÓN POSTQUIRÚRGICA PARA BLEFAROPLASTÍA

Antibiótico Vía Oral

- Optamox dúo 1 comprimido cada 12 horas por 8 días, (comenzar a las 21 o 22 horas luego de la cena así le toca a las 9 o 10 horas después de desayunar). No tomar juntos a los analgésicos. Luego de las comidas.

Analgesia moderada Vía Oral

- **Paracetamol 1 gramo** 1 comprimido cada 8 horas las primeras 48 horas luego se puede espaciar a demanda del paciente cada 8 o 12 horas.
- **Ketorlac 20 mg** 1 comprimido cada 6 horas las primeras 48 horas luego se puede espaciar a demanda del paciente cada 8 o 12 horas. **Este se toma junto al Tramadol para potenciar su efecto.**
- **Puede ingerir Reliveran comprimido cada 8 horas 1 hora antes del Tramadol para evitar nauseas.**

Luego de 72 horas

- **Ibuprofenos 600mg** 1 comprimido cada 8 horas y luego según el dolor puede regularlo cada 12 horas o SOS.
- **Paracetamol 1 gramo** 1 comprimido cada 8 horas y luego según el dolor puede regularlo cada 12 horas o SOS.

Ocular

- **Tobradex 1 gota en cada ojo** cada 2 horas las primeras 48 horas, luego cada 4 horas los siguientes 3 días y luego cada 6 horas hasta terminarlo. **No colocar al dormir.**
- **Ungüento de tobramicina antes de dormir si el medico se lo indico.**
- **Lagrimas artificiales** a demanda para evitar ojo seco, puede colocarse cuando desee por tiempo indeterminado.



- **Té de manzanilla** dos saquitos o hebras hacerlo con agua hirviendo, dejar reposar y cuando se enfrié colocar en la heladera. Embebiendo compresas, algodón, gasa o apósito con el té, escurrir y se coloca sobre los ojos 30 min y luego descansa, repetirlo de 5 a 6 veces al día.
- **Hielo local** con geles fríos no directamente, colocar sobre un paño o compresa para evitar quemaduras. Puede colocarse 20 min y descansar 2 horas varias veces al día por 72 horas.
- **Ciloxadex ungüento** Si se lo indica el Dr. Ballario, sobre las heridas dos veces por día por 6 días para evitar costras.

- Si sufre de gastritis recuerde tomar 1 comprimido de Omeprazol 40 mg antes de desayunar y luego antes de cenar por 15 días.
- En caso de habersele indicado Enoxaparina de bajo peso molecular debe preguntarle al médico esquema de prevención antitrombótica.
- Recuerde que, si toma medicación crónica preguntarle al Dr. Ballario cuando la restituye, ya sea T4, Antihipertensivos, anticoagulantes, analgésicos, terapia de remplazo hormonal, etc.