



MEDICACIÓN POSTQUIRÚRGICA PARA MASTOPLASTIA AUMENTATIVA - RETRO MUSCULAR

Antibiótico Vía Oral

- Optamox dúo 1 comprimido cada 12 horas por 8 días, (comenzar a las 21 o 22 horas luego de la cena así le toca a las 9 o 10 horas después de desayunar). No tomar juntos a los analgésicos. Luego de las comidas.

Analgesia Fuerte

- **Calmador plus (tramadol mas paracetamol)** ½ comprimido cada 6 horas las primeras 48 horas luego se puede espaciar a demanda del paciente cada 8 horas o 12.
- **Ketorlac 20 mg** 1 comprimido cada 6 horas las primeras 48 horas luego se puede espaciar a demanda del paciente cada 8 o 12 horas. **Éste se toma junto al Tramadol para potenciar su efecto.**
- **Puede ingerir Reliveran comprimido cada 8 horas 1 hora antes del Tramadol para evitar las náuseas.**

Luego de 72 horas

- **Ibuprofenos 600mg** 1 comprimido cada 8 horas y luego según el dolor puede regularlo cada 12 horas o SOS.
- **Paracetamol 1 gramo** 1 comprimido cada 8 horas y luego según el dolor puede regularlo cada 12 horas o SOS.
- Si sufre de gastritis recuerde tomar 1 comprimido de Omeprazol 40 mg antes de desayunar y luego antes de cenar por 15 días.
- En caso de habersele indicado Enoxaparina de bajo peso molecular debe preguntarle al médico esquema de prevención antitrombótica.
- Recuerde que si toma medicación crónica preguntarle al Dr. Ballario cuando la restituye, ya sea T4, Antihipertensivos, anticoagulantes, analgésicos, terapia de remplazo hormonal, etc.