



DR. FEDERICO BALLARIO
CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y RECONSTRUCTIVA

MEJORE SU COMODIDAD DESPUÉS DE LA CIRUGÍA

Los paquetes de última generación para el dolor posquirúrgico del Dr. Ballario son ideales para los pacientes que desean la recuperación más cómoda posible.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL MANEJO DEL DOLOR POSTOPERATORIO?

Reducir cualquier dolor que pueda experimentar después de la cirugía puede tener enormes beneficios para su bienestar físico y mental. Le permite sentirse más como usted mismo antes para que pueda concentrarse en disfrutar de su tiempo de inactividad y los próximos resultados.

Elegir uno de los paquetes para el dolor del Dr. Ballario también puede:

- Disminuir las náuseas y los mareos después de la anestesia.
- Reducir el dolor postoperatorio en más del 50 por ciento
- Le permite reanudar antes las actividades ligeras, lo que mejora su recuperación
- Elimine las conjeturas sobre qué analgésicos tomar para aliviar el dolor
- Menor dependencia de analgésicos narcóticos, que pueden ser adictivos
- Evite los efectos secundarios de los narcóticos, como niebla mental, confusión, somnolencia, respiración lenta, malestar estomacal y estreñimiento.

PAQUETES DE DOLOR POSQUIRÚRGICO

Basándose en años de investigación/ciencia, comentarios de pacientes y su experiencia como Cirujano Plástico, el Dr. Ballario ha seleccionado los siguientes paquetes de dolor para que los aproveche:



Paquete de Analgesia Moderada

- Ketorolac 20mg 1 comprimido cada 8 horas por 72 horas.
- Paracetamol 1 gr 1 comprimido cada 8 horas junto al Ketorolac por 72 horas.

Luego de 72 horas:

- Ibuprofeno 600mg cada 8 horas.
- Paracetamol 1 gr 1 comprimido cada 8 horas junto al ibuprofeno, luego puede espaciarlo cada 12 horas o 24 horas dependiendo del dolor o utilizarlo SOS.
-

Paquete de Analgesia Fuerte

- Ketorolac 20mg 1 comprimido cada 8 horas por 96 horas.
- Tramadol mas Paracetamol 1 comprimido cada 8 horas junto al Ketorolac. por 72 horas.
- Reliveran comprimido 1 comprimido cada 8 horas mientras consume Tramadol.

Luego de 96 horas:

- Ibuprofeno 600mg cada 8 horas.
- Paracetamol 1 gr 1 comprimido cada 8 horas junto al ibuprofeno, luego puede espaciarlo cada 12 horas o 24 horas dependiendo del dolor o utilizarlo SOS.